



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Rassegna Stampa

di Venerdì 4 giugno 2021

07:24 **Ufo, intelligence Usa: non ci sono prove certe di presenza aliena**

07:08 **Scintille in tv tra Landini e Santanchè**

00:01 **Zona bianca regioni, ristoranti al chiuso: tavoli e regole**

23:39 **Covid, Crisanti: "7000 morti in mese fantastico..."**

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Temi caldi

Speciali

Home Salute

ORA IN

Prima pagina

Farmaci, Guggino (UniPa): "upadacitinib riduce il dolore in pazienti con spondilite anchilosante"

04 giugno 2021 | 09.31
LETTURA: 3 minuti



Covid Italia, Rt ancora in calo: 0.68

Milano, 38enne accoltellato a morte dopo il calcetto: 6 arresti

Covid Italia, altre 4 Regioni verso la zona bianca



Immagine di repertorio (Fotogramma)

Patiscono **grandi dolori alla schiena** senza capirne il motivo. Sono i 40mila italiani affetti da **spondilite anchilosante**, malattia infiammatoria cronica articolare che insorge tipicamente nei giovani intorno ai 30 anni e può avere gravi conseguenze dal punto di vista lavorativo (per difficoltà a svolgere le proprie mansioni a causa dei dolori e delle ripetute assenze), psicologico e sociale. Se non viene adeguatamente trattata, determina un progressivo irrigidimento della colonna vertebrale con atteggiamenti in flessione obbligata del collo e impossibilità a flettere la colonna.

"A differenza delle altre malattie reumatologiche che sono appannaggio delle donne, la spondilite anchilosante **colpisce più frequentemente persone di sesso maschile tra i 25 e i 40 anni** - afferma Giuliana Guggino, professore associato di Reumatologia e responsabile dell'Uo di Reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo - si manifesta con lombalgia infiammatoria, un dolore che tende a peggiorare con il riposo e a migliorare con il movimento. Al dolore, però, si associa anche la rigidità che è espressione nel tempo di un danno articolare. Per questo motivo è **importante la diagnosi precoce**: prima interveniamo e prima possiamo modificare la storia naturale della patologia, evitare che vi siano danni articolari irreversibili, anche grazie ai nuovi farmaci che abbiamo a disposizione. Tra i farmaci di ultima generazione c'è l'upadacitinib, i cui studi hanno dimostrato efficacia e sicurezza nei pazienti con spondilite anchilosante, riducendo l'attività di malattia e quindi il dolore".

Dolore lombare e rigidità articolare, limitazioni nei movimenti e problemi

M5S, De Vito querela Lezzi

Caldo con le ore contate, previsioni weekend 4-6 giugno

ARTICOLI

in Evidenza



News in collaborazione con Fortune Italia



La chimica del futuro per la transizione energetica



Giornata Ambiente, l'usato aiuta a salvare il Pianeta



Made Green in Italy: decolla lo schema di certificazione per le eccellenze italiane sostenibili



Atac, presentati 30 nuovi autobus ibridi




Coronaropatie, accordo Medtronic-Fbf S. Pietro Roma basato su esito clinico



Levissima sarà carbon neutral nel 2022



V-Ita Group, con 27mila pezzi venduti 2020 anno della conferma



Malattie Reumatiche: aspetti clinici e novità terapeutiche dal Congresso Eular2021

della colonna vertebrale, del bacino o del collo, che non si risolvono e che non hanno una spiegazione sono i sintomi che non vanno ignorati. Meglio parlarne con un medico. Un giovane uomo "con dolore lombare di tipo infiammatorio che dura da più di 3 mesi deve essere sicuramente attenzionato per una sospetta spondiloartrite", sostiene la reumatologa. "Questo tipo di paziente - prosegue - generalmente lamenta un dolore insidioso, che tende a cronicizzarsi e ad aggravarsi rapidamente, tanto da richiedere l'aiuto di un medico specialista. La spondilite anchilosante, se non trattata, può determinare anchilosi non solo delle articolazioni sacroiliache, ma anche dei corpi vertebrali assumendo il classico aspetto a 'canna di bamboo' che di fatto impedisce i movimenti. Di conseguenza, il nostro obiettivo è quello di intervenire rapidamente con la terapia per evitare che il paziente possa manifestare danni articolari così gravi".

Le terapie per la spondilite anchilosante, e per tutte le spondiloartriti, sono in questi giorni al centro del **Congresso dell'European League Against Rheumatism (Eular)** in programma dal 2 al 5 giugno, trasmesso in streaming a causa della pandemia.

"Tra le nuove strategie terapeutiche - spiega Guggino - l'**upadacitinib**, farmaco somministrato per via orale, della categoria degli inibitori selettivi di Jak, sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3 presentati in occasione di Eular2021. I cosiddetti Jak inibitori stanno infatti modificando il trattamento dei pazienti con spondiloartrite. Inoltre, la monosomministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio". E proprio l'upadacitinib è **la prima terapia innovativa in pillole approvata dall'Ema per il trattamento delle spondiloartriti**.

"Questa terapia - continua l'esperta - è **molto efficace anche nel trattamento di pazienti con artrite psoriasica**, patologia che nel nostro Paese riguarda circa 100mila persone, tra i 30 e i 50 anni. Tra i sintomi, oltre al dolore che può interessare la colonna e il bacino, le articolazioni periferiche e le entesi risultano ampiamente coinvolte. Dalla artrite psoriasica, così come dalla spondilite anchilosante, non si può guarire, tuttavia la malattia può essere tenuta sotto controllo grazie alle armi terapeutiche di cui oggi disponiamo: cDMARDs, farmaci biotecnologici, e tsDMARDs, capaci di ridurre sensibilmente l'attività di malattia. Da Eular2021 - conclude Guggino - ci arrivano dati sicuramente confortanti: abbiamo nuove strategie terapeutiche, farmaci efficaci e sicuri e abbiamo i mezzi per conoscere la patogenesi di queste malattie. Tutto ciò permette a noi medici di trattare adeguatamente i nostri pazienti".

RIPRODUZIONE RISERVATA
 © COPYRIGHT ADNKRONOS



in Evidenza

Energia, l'esperto: "Su idrogeno verde recuperare ritardi e prevedere incentivi"



in Evidenza

Cardiochirurgia: Corcym, società di device cardiologici debutta a livello globale



in Evidenza

#1000azionioltrelaSM - Verso l'Agenda 2025



in Evidenza

ENGIE, attestato di eccellenza da Great place to work Italia



in Evidenza

Fondazione Barilla lancia We, the Food, the Planet



in Evidenza

Gravidanza e sclerosi multipla: ieri, oggi e domani



in Evidenza

Leucemia linfatica cronica, benefici ibrutinib da solo e in mix



in Evidenza

"Riprendiamoci il gusto del futuro"



in Evidenza

Articoliamo fa tappa a Vicenza



in Evidenza

Diagnosi Covid dal respiro, italiani testano dispositivo che 'archivia' tampone



in Evidenza

Mediolanum Market Forum 2021



in Evidenza

Al via 'Voci per la Salute', podcast in 12 puntate su benessere e ricerca



in Evidenza

Vitamina D, Ormoni, Covid-19 e differenze di genere

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca [INFORMATIVA](#). Se si prosegue alla navigazione di questo sito si dà il consenso automatico all'uso dei cookie

ACCONSENTI

LA SICILIA

Menu



Farmaci: Guggino (UniPa), 'upadacitinib ...



Medicina: Tonolo (Anmar), 'anche 7-8 ann...



Medicina: coronaropatie, accordo Medtron...



sei in » **Salute**

SALUTE

Farmaci: Guggino (UniPa), 'upadacitinib riduce dolore in pazienti spondilite anchilosante'

03/06/2021 - 18:30

La reumatologa, 'da Eular2021 nuovi studi confermano efficacia e sicurezza'



IL GIORNALE DI OGGI




Sfoggia

Abbonati

ARCHIVIO STORICO DIGITALE LA SICILIA

I TITOLI del GIORNO

I VIDEO



Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Patiscono grandi dolori alla schiena senza capirne il motivo. Sono i 4,0milioni italiani affetti da spondilite anchilosante, malattia infiammatoria cronica articolare che insorge tipicamente nei giovani intorno ai 30 anni e può avere gravi conseguenze dal punto di vista lavorativo (per difficoltà a svolgere le proprie mansioni a causa dei dolori e delle ripetute assenze), psicologico e sociale. Se non viene adeguatamente trattata, determina un progressivo irrigidimento della colonna vertebrale con atteggiamenti in flessione obbligata del collo e impossibilità a flettere la colonna.

"A differenza delle altre malattie reumatologiche che sono appannaggio delle donne, la spondilite anchilosante colpisce più frequentemente persone di sesso maschile tra i 25 e i 40 anni - afferma Giuliana Guggino, professore associato di Reumatologia e responsabile dell'Uo di Reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo - si manifesta con lombalgia infiammatoria, un dolore che tende a peggiorare con il riposo e a migliorare con il movimento. Al dolore, però, si associa anche la rigidità che è espressione nel tempo di un danno articolare. Per questo motivo è importante la diagnosi precoce: prima interveniamo e prima possiamo modificare la storia naturale della patologia, evitare che vi siano danni articolari irreversibili, anche grazie ai nuovi farmaci che abbiamo a disposizione. Tra i farmaci di ultima generazione c'è l'upadacitinib, i cui studi hanno dimostrato efficacia e sicurezza nei pazienti con spondilite anchilosante, riducendo l'attività di malattia e quindi il dolore".

Dolore lombare e rigidità articolare, limitazioni nei movimenti e problemi della colonna vertebrale, del bacino o del collo, che non si risolvono e che non hanno una spiegazione sono i sintomi che non vanno ignorati. Meglio parlarne con un medico. Un giovane uomo "con dolore lombare di tipo infiammatorio che dura da più di 3 mesi deve essere sicuramente attenzionato per una sospetta spondiloartrite", sostiene la reumatologa. "Questo tipo di paziente - prosegue - generalmente lamenta un dolore insidioso, che tende a cronicizzarsi e ad aggravarsi rapidamente, tanto da richiedere l'aiuto di un medico specialista. La spondilite anchilosante, se non trattata, può determinare anchilosi non solo delle articolazioni sacroiliache, ma anche dei corpi vertebrali assumendo il classico aspetto a 'canna di bamboo' che di fatto impedisce i movimenti. Di conseguenza, il nostro obiettivo è quello di intervenire rapidamente con la terapia per evitare che il paziente possa manifestare danni articolari così gravi".

Le terapie per la spondilite anchilosante, e per tutte le spondiloartriti, sono in questi giorni al centro del Congresso dell'European League Against Rheumatism (Eular) in programma dal 2 al 5 giugno, trasmesso in streaming a causa della pandemia.

"Tra le nuove strategie terapeutiche - spiega Guggino - l'upadacitinib, farmaco somministrato per via orale, della categoria degli inibitori selettivi di Jak, sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3 presentati in occasione di Eular2021. I cosiddetti Jak inibitori stanno infatti modificando il trattamento dei pazienti con spondiloartrite. Inoltre, la mono-somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio". E proprio l'upadacitinib è la prima terapia innovativa in pillole approvata dall'Emm per il trattamento delle spondiloartriti.

"Questa terapia - continua l'esperta - è molto efficace anche nel trattamento di



Festa della Repubblica, a Catania le celebrazioni in piazza Bellini



I PRESS NEWS



PUBBLICATO DECRETO ATTUATIVO: FILIERA DELLE BEVANDE E PMI A RISCHIO «Sugar tax, uno

sgambetto durante la corsa verso la ripresa: adesso attendiamo l'esito del ricorso della Regione Siciliana»



CATANIA Da giugno nuovo collegamento di trasporto pubblico tra

Humanitas e il centro città



NUOVI MODELLI ABITATIVI CONTRO OBSOLESCENZA E DEGRADO DEL "COSTRUITO"

«Sviluppo urbano verticale: a Catania futuro possibile»

LODICO A LASICILIA

349 88 18 870



Catania: varchi utilizzati in ore notturne al Parco Gioeni



pazienti con artrite psoriasica, patologia che nel nostro Paese riguarda circa 100mila persone, tra i 30 e i 50 anni. Tra i sintomi, oltre al dolore che può interessare la colonna e il bacino, le articolazioni periferiche e le entesi risultano ampiamente coinvolte. Dalla artrite psoriasica, così come dalla spondilite anchilosante, non si può guarire, tuttavia la malattia può essere tenuta sotto controllo grazie alle armi terapeutiche di cui oggi disponiamo: cDMARDS, farmaci biotecnologici, e tsDMARDS, capaci di ridurre sensibilmente l'attività di malattia. Da Eular2021 - conclude Guggino - ci arrivano dati sicuramente confortanti: abbiamo nuove strategie terapeutiche, farmaci efficaci e sicuri e abbiamo i mezzi per conoscere la patogenesi di queste malattie. Tutto ciò permette a noi medici di trattare adeguatamente i nostri pazienti".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

VUOI LASCIARE UN COMMENTO ?

Testo

Caratteri rimanenti: 1000


INVIA



Medicina: Tonolo (Anmar), 'anche 7-8 anni per diagnosi spondilite anchilosante'



Medicina: Tonolo (Anmar), 'anche 7-8 anni per diagnosi spondilite anchilosante'



Medicina: coronaropatie, accordo Medtronic-Fbf S. Pietro Roma basato su esito clinico

GOSSIP-MONDO



Sicilians



Filippo Alongi, a Verona un medico siciliano che combatte il cancro con la radioterapia

GOSSIP



I 60 anni di Alba Parietti: lei anticipa firma del vestito e tema della festa

Qua la zampa



Capriolo a nuoto attraversa la Laguna di Venezia

EVENTI



Mario Venuti, il ritorno: ecco i due concerti in Sicilia